

Ivermectine.

1975 Ivermectine wordt door Satoshi Ōmura ontdekt en door William C. Campbell, verder uitgewerkt als anti parasitair middel.

1981 wordt Ivermectine als diergeneesmiddel onder de naam Mectizan geregistreerd.

1987 wordt Ivermectine voor menselijk gebruik geregistreerd.

2015 Ivermectine krijgt de Nobel prijs

1990 tot heden WHO, in samenwerking met Merck, verstrekt gratis Ivermectine in het Mectizan Donation Program".

In meer dan 58 landen worden jaarlijks 100 miljoen doseringen aan mensen verstrekt en is het daarmee het langstlopende en succesvolste medicijn donatieprogramma ooit.

Ivermectine wordt in de praktijk profylactisch ingezet voor massale toediening ter preventie van ziekten. Dit preventieve gebruik is niet als zodanig geregistreerd in 1987 en daarom is dit gebruik een off-label toepassing. Dit Off Label gebruik is juridisch niet juist, maar is door de WHO, de CDC en de FDA **een geaccepteerde en gereguleerde volksgezondheidsinterventie**.

2020 Het gebruik van Ivermectine voor Covid wordt door de WHO in verschillende landen verboden en strafbaar gesteld, omdat dit een Off Label gebruik is. Gelijktijdig propageert dezelfde WHO het Off Label gebruik al meer dan 30 jaar en is het al **5 miljard** keer toegediend. De dosering en toediening van Ivermectine voor Covid is gelijk aan het Mectizan Donation Program, dat ook tijdens het verbod gewoon doorging.

De 5 miljardste behandeling met Ivermectine bij mensen werd op 30 januari 2025 in Haarlem gevierd in de fabriek van Merck, waar dagelijks 1,2 miljoen pillen worden geproduceerd en wereldwijd in 58 landen worden gedistribueerd.

<https://msd.nl/stories/5-miljardste-behandeling-voor-rivierblindheid-en-olifantsziekte/>

2020 – heden In verschillende landen in Azië, o.a. India maar ook in Afrika en Zuid Amerika wordt Ivermectine al meer dan **100 miljoen** keer, zowel als profylaxe als medicatie, voor **Sars-Cov 2** succesvol gebruikt.

ivermectine (off-label)



Gebruikt in 58 landen
Levensreddend, bejubeld door WHO



Gebruik in Nederland
Verboden en bestraft

Ivermectine is anti-parasitair, anti-viraal, anti-tumor en is een positieve immuun modulator. Hoe kan één molecuul zoveel functies hebben?

Ivermectine, afkomstig van de bacterie *Streptomyces avermitilis* is een combinatie van drie biologische verbindingen, die ieder afzonderlijk een anti parasitaire en antivirale werking hebben. Het molecuul is opgebouwd uit een combinatie van een lacton, spiroketaal en benzofuraan en een daaraan gekoppelde disaccharide.

Er zijn meer dan 11.000 wetenschappelijke studies over Ivermectine.


De **anti-parasitaire werking** van Ivermectine berust op meerdere mechanismen, waaronder het blokkeren van een aantal specifieke ion-kanalen zoals de glutamaat-gated chloridekanalen die alleen maar bij parasieten voorkomen.

De **Immuun modulerende werking** berust op het reguleren van minstens 10 verschillende systemen. Zoals remming van pro-Inflammatoire cytokinen, stimulering van anti-inflammatoire cytokinen, waardoor het immuunsysteem uit zijn cytokinestorm komt en weer in balans terugkeert. Activiteit van Toll-like receptoren. Macrofagen etc. etc..

De **antivirale werking** berust op het remmen van de aanhechting aan de cel, het binnenkomen, het intra cellulaire transport naar de celkern, de replicatie en ook de post translationele modificatie van het virus. Daarnaast worden het import superfamily systeem en de karyoferine receptoren geremd.


Deze sterke antivirale werking is effectief bij 0,2 mg/kg lichaamsgewicht. Deze dosering van 0,2 mg/kg lichaamsgewicht is in het kader van het Mectizan Donation Program, mondiaal meer dan **5 miljard** keer zonder wezenlijke problemen gebruikt.

De **Anti-Tumor werking** berust op het remmen van: de WNT/ β -catenin signalering, de PAK1/Akt/mTOR pathway, de P-glycoprotein (P-gp) / ABC transporters, de Importin α/β activiteit en stimuleert de anti-tumor immuun respons.



De structuur van Ivermectine

Ivermectine, Fenbendazol bestellen via deze link: <https://ecoboerderij-dehaan.nl>



Behandeling voor virale of parasitaire infecties

Drie dagen Ivermectine 0.2 mg/kg lichaamsgewicht.

Indien niet voldoende, na twee dagen rust weer drie dagen 0,2 mg/kg Ivermectine.

Behandeling bij tumoren:

Drie dagen 0,4 mg/kg lichaamsgewicht daarna twee dagen rust.

Dan twee dagen 0,4 mg/kg en weer twee dagen rust.

Dit herhalen tot tumor weg is.

Daarna 10 mg Ivermectine eenmaal per week als onderhoudsdosis.

Behandeling met Ivermectine en Fenbendazol

Hetzelfde als het Ivermectine schema maar op de tweede dag rust 500 mg Fenbendazol

Dit 5 maal herhalen en dan alleen verder met het Ivermectine protocol.

Bij uitzaaiingen in de hersenen Fenbendazol vervangen door Mebendazol, (gaat beter door bloed/hersen barrière).

Omdat In Nederland artsen beboet worden en hun BIG registratie kwijt kunnen raken bij het voorschrijven van Ivermectine, is er geen bereidheid voor een dergelijke behandeling.

Dus neem eigen initiatief en realiseer je dat behandelingen met Ivermectine miljarden keren zijn toegepast zonder wezenlijke bijwerkingen.